

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL**Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales**

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION


La cinétique chimique consiste à étudier l'évolution temporelle d'une réaction chimique. Elle permet, par exemple, de formuler des hypothèses sur le mécanisme réactionnel d'une réaction.

Pour tester ces hypothèses, les chimistes peuvent chercher à déterminer expérimentalement la loi de vitesse par rapport à un réactif avec son ordre de réaction.

Le but de cette épreuve est de déterminer si la réaction entre les ions peroxydisulfate et les ions iodure vérifie une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à la concentration en ions peroxydisulfate.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT**Réaction chimique entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure**

La réaction entre les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ et les ions iodure I^- est modélisée par l'équation suivante :



Toutes les espèces chimiques intervenant dans cette réaction sont incolores en solution aqueuse à l'exception du diiode qui confère une couleur jaune à la solution.

Après le mélange des deux réactifs, une coloration jaune apparaît progressivement.

Suivi cinétique de la réaction par spectrophotométrie

Dans ce suivi, les ions iodures I^- sont toujours introduits en large excès par rapport aux ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$. La loi de Beer-Lambert permet de relier l'absorbance de la solution à la concentration en diiode. On peut alors en déduire la concentration en ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$.

Ainsi, si la réaction totale est d'ordre 1 par rapport à la concentration en ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$, l'absorbance de la solution vérifie la relation :

$$\ln\left(\frac{A_{max}}{A_{max} - A(t)}\right) = k \times t$$

où A_{max} est l'absorbance de la solution à l'état final et k une constante.

Modélisation de la courbe de la répartition des points expérimentaux

On considère ici que la modélisation est considérée valide :

- si la répartition des points expérimentaux est en accord avec la courbe modélisée ;
- si le coefficient de corrélation est compris entre 0,99 et 1.

TRAVAIL À EFFECTUER**1. Suivi cinétique (10 minutes conseillées)**



Mettre en œuvre le protocole suivant :

- Paramétrer le logiciel de l'interface d'acquisition pour effectuer une saisie de mesures, toutes les 2 ou 3 secondes, pour une durée totale de 20 minutes ;
- Faire le zéro du spectrophotomètre avec de l'eau distillée à une longueur d'onde de 500 nm ;
- Prélever 10,0 mL de solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium ($2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}_{(aq)}$) de concentration en quantité de matière $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et introduire ce prélèvement dans un bécher n°1 de 50 mL.

Les étapes suivantes devront être mises en œuvre rapidement :

- Prélever 10 mL de solution d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$) de concentration en quantité de matière $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et verser ce prélèvement dans le bécher n°1 pour constituer le mélange réactionnel ;

- Agiter rapidement le mélange, en prélever un échantillon et le verser dans une cuve pour spectrophotomètre ;
- Placer la cuve dans le spectrophotomètre et démarrer l'acquisition ;
- Pendant l'acquisition, **commencer à traiter le paragraphe 2.**

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté	

2. Préparation de la solution de peroxydisulfate de potassium (20 minutes conseillées)

La solution de peroxydisulfate de potassium de concentration en quantité de matière $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ utilisée dans la partie 1 a été obtenue par **dilution** d'une solution mère à la concentration en quantité de matière de $2,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



2.1. Sélectionner le matériel nécessaire à la réalisation de cette dilution en justifiant.

- On a : $C_{\text{fille}} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $C_{\text{mère}} = 2,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D'après la formule du facteur de dilution : $F = C_{\text{mère}} / C_{\text{fille}}$; F est égal à : 20

$V_{\text{fille}} = 10,0 \text{ mL}$ (j'ai utilisé la valeur de la solution prélevée dans la partie 1) donc (d'après la 2nd formule du facteur de dilution $F = V_{\text{fille}} / V_{\text{mère}}$) : $V_{\text{mère}} = V_{\text{fille}} / F$ $V_{\text{mère}} = 0,5 \text{ mL}$

- *De ce fait, il faut disposer d'une pipette jaugée de 5mL pour prélever la solution mère de 0,5 mL (résultat peut-être bizarre mais je ne vois pas comment en obtenir un autre car celui-ci correspond à la formule...) que l'on versera dans une fiole jaugée de 10 mL : on remplit d'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on mélange afin d'obtenir la solution fille (le peroxydisulfate de potassium).*

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter le matériel sélectionné ou en cas de difficulté	

2.2. Effectuer cette dilution afin de préparer une solution de peroxydisulfate de potassium de concentration en quantité de matière $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

3. Modélisation et détermination de l'ordre de la réaction (30 minutes conseillées)

3.1. À partir de l'information relative au suivi cinétique de la réaction par spectrophotométrie, indiquer la courbe à tracer pour vérifier si la réaction totale étudiée est d'ordre 1 par rapport à la concentration en ions peroxydisulfate $S_2O_8^{2-}$. Préciser les grandeurs à porter sur les deux axes. Expliquer la démarche suivie.

ORDRE DE RÉACTION

Session
2022

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.